

Programa Nacional de Vacinação 06/2015 & Vacinas Extra-PNV mais frequentes na criança													
Vacina	IDADE												
	Nasci-mento	2 Meses	3 Meses	4 Meses	5 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	5-6 Anos	10-13 Anos	Toda a vida 10/10 anos
Tuberculose	BCG												
Hepatite B	VHB 1	VHB 2				VHB 3							
<i>Haemophilus influenza b</i>		Hib 1		Hib 2		Hib 3			Hib 4				
Difteria-Tétano-Tosse convulsa		DTPa 1		DTPa 2		DTPa 3			DTPa 4		DTPa 5	Td	Td
Poliomielite		VIP 1		VIP 2		VIP 3					VIP 4		
<i>Strep. pneumoniae (a)</i>		Pn13 1		Pn13 2				Pn13 3					
<i>N. meningitidis C</i>								Men C					
Sarampo- Parotidite epidémica-Rubéola								VASPR 1			VASPR 2		
Vírus do Papiloma humano (b)												HPV (0M/6M)	
Rotavírus (c)	<i>Rotateq</i> ® 3 Doses		RTQ 1		RTQ 2		RTQ 3						
	<i>Rotarix</i> ® 2 Doses		RTX 1		RTX 2								
<i>N. meningitidis B (c, d)</i> (Bexsero®)	Idade de início 2M-5M → 3d+1d		BX 1		BX 2		BX 3	BX 4 (12- 23M)					
	Idade de início 6M-11M → 2D+1D						BX 1	BX 2	BX 3 (12-23M)				
	Idade de início 12M-23M → 2D+1D							BX 1	BX 2		BX 3 12-24 meses após BX 2		

(a) Pn13: Aplicável às crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2015;
(b) HPV: aplicável apenas a raparigas. Esquema de vacinação 0, 6 meses;
(c) Vacina não contemplada no plano nacional de vacinação;
(d) Escolher esquema vacinal mediante idade de início de vacinação da criança - ilustrados possíveis esquemas;
Bexsero® - Após os 24 meses de idade, necessárias 2 doses com mínimo de 2 meses de intervalo para crianças até aos 10 anos (0, 2 meses); Após os 10 anos e para adultos, apenas 1 mês de intervalo entre doses (0, 1 mês).

Resumo baseado na norma 008/2015 da DGS

Porto, 18 de junho de 2015
Brenda Domingues
Medicina Geral e Familiar