



ANTIDIABÉTICOS NÃO INSULÍNICOS

Autor(es): **Catarina Pinhão, Olga Carneiro**
Local de Trabalho: **USF Andreas, Aces Oeste Sul, ARSLVT**

Classe	DCI	Nome comercial	Associação com metformina	Outras associações	Ajuste renal	Notas	Efeitos adversos	
Biguanidas	Metformina (500; 850; 1000)	Risidon [®] (850; 1000)			TFGe < 30 mL/min/1.73m ² → contraindicado TFGe < 60 ml/min/1.73m ² → não iniciar 30 < TFGe < 45 mL/min/1.73m ² → 500 mg 2id	Contraindicado: - IC grave aguda e instável; - desidratação, infecção grave e choque	Efeitos GI (náuseas; diarreia) Défice de B12 Acidose láctica (muito raro)	
		Glucophage [®] (500)						
		Stagid [®] (700)						
iSGLT2	Empagliflozina	Jardiance [®] (10; 25)	Sinjardy [®] (5/850; 5/1000; 12.5/850; 12.5/1000)	+ Linagliptina → Glyxambi [®] (10/5; 25/5)	TFGe < 60 mL/min/1.73m ² → 10 mg 1id	IC (FEj preservada e reduzida)	Infecções Genito-Urinárias Hipoglicemia Risco de desidratação	
	Canagliflozina	Invokana [®] (100; 300)	Vokanamet [®] (50/1000)		TFGe < 60 mL/min/1.73m ² → 100 mg 1id			
	Dapagliflozina	Forxiga [®] (10)	Xigduo [®] (5/850; 5/1000)	+ Saxagliptina → Qtern [®] (10/5)	sem necessidade de ajuste	STOP TFGe < 30 mL/min/1.73m ²	IC (FEj preservada)	↑ colesterol Alterações cutâneas Risco de cetoacidose (raro) Gangrena de Fournier
	Ertugliflozina	Steglaro [®] (5; 15)	Segluromet [®] (2.5/1000; 7.5/1000)		TFGe < 45 mL/min/1.73m ² → não iniciar			

Bibliografia:

Infomed (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)

Resumo Características Medicamento (RCM) (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)

Classe	DCI	Nome comercial	Associação com metformina	Outras associações	Ajuste renal	Notas	Efeitos adversos
aGLP1	Semaglutide	Ozempic [®] (0.25; 0.5; 1)			OK TFG _e > 15 mL/min/1.73m ²	semanal	Efeitos GI comuns (náuseas; diarreia, vômitos)
	Exenatide	Bydureon [®] (2)			STOP TFG _e < 30 mL/min/1.73m ²		
	Dulaglutide	Trulicity [®] (0.75; 1.5)					Reações local injeção
	Liraglutide	Saxenda [®] (6) (obesidade)			OK TFG _e > 15 mL/min/1.73m ²	diário	Reações alérgicas graves Pancreatite Aguda Hipoglicemia (terapêutica combinada)
TZDs	Pioglitazona (15; 30; 45)	Actos [®] (15; 30; 45)	Competact [®] (15/850)	+ Glimepirida → Tandemact [®] (30/4; 30/2)	Não recomendado na DRC	Contraindicado na ICC	Retenção hídrica (edema; IC) Risco fraturas ósseas em mulheres Neoplasia da bexiga
SU	Glicazida (30; 60; 80)	Diamicron LM [®] (30; 60)			Contraindicado em IR ou Hepática grave	Necessário titular dosagem	Hipoglicemia Alterações hematológicas Alterações hepatobiliares
	Glibenclamida (2.5; 5)	Daonil [®] (5)	Glucovance [®] (2.5/500)				

Bibliografia:

 Infomed (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)

 Resumo Características Medicamento (RCM) (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)

Classe	DCI	Nome comercial	Associação com metformina	Outras associações	Ajuste renal	Notas	Efeitos adversos
iDPP4	Sitagliptina	Januvia [®] (25; 50; 100)	Janumet [®] (50/850; 50/1000)		TFGe > 60 mL/min/1.73m ² → 100mg 1id		
			Efficib [®] (50/850; 50/1000)		30 < TFGe < 60 mL/min/1.73m ² → 50mg 1id		
			Velmetia [®] (50/850)		TFGe < 30 mL/min/1.73m ² → 25mg 1id		
	Saxagliptina	Onglyza [®] (5)	Komboglyze [®] (2.5/850; 2.5/1000)	+ Dapagliflozina → Qtern [®] (5/10)	TFGe < 45 mL/min/1.73m ² → 2.5mg 1id		
	Vildagliptina	Galvus [®] (50)	Eucreas [®] (50/850; 50/1000)		TFGe > 60 mL/min/1.73m ² → 50mg 2id		
			Jalra [®] (50)	Zomarist [®] (50/850; 50/1000)			
Xiliarx [®] (50)			Icandra [®] (50/850; 50/1000)		TFGe < 30 mL/min/1.73m ² → 50mg 1id		
Alogliptina	Vipidia [®] (6.25; 12.5; 25)	Vipdomet [®] (12.5/1000; 12.5/850)	+ Pioglitazona → Ingresync [®] (12.5/30; 25/30)	CrCl ≥ 30 a ≤ 50 ml/min → 2.5mg 1id CrCl < 30 ml/min → 6.25mg 1id			
Linagliptina	Trajenta [®] (5)	Jentadueto [®] (2.5/850; 2.5/1000)	+ Empagliflozina → Glyxambi [®] (5/10; 5/25)	Sem necessidade de ajuste			

Bibliografia:

 Infomed (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)

 Resumo Características Medicamento (RCM) (<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>)